

¿EXISTEN DIFERENCIAS CLÍNICAS EN LA MUJER Y EL RECIÉN NACIDO ENTRE LAS PREECLAMPSIAS PRECOCES Y TARDÍAS?

ANÁLISIS DE CINCO AÑOS

Gallego Bazán, Y.¹, De la Espada Piña, V.¹, Lancho Novillo, C.¹, García Herrera, AL¹, Quirós Ganga, PL.¹, Remón Rodríguez, C.¹.

1. Servicio de Nefrología. Hospital Universitario Puerto Real. Servicio Andaluz de Salud (Cádiz).

INTRODUCCIÓN

- La preeclampsia es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión y enfermedad renal durante el embarazo.
- La mayor parte se presenta en el período prematuro tardía (>34 semanas) con buen desenlace clínico. La otra parte se presenta en período prematuro temprano con mayor índice de complicaciones y partos prematuros.
- En este estudio analizamos los factores de riesgo y las características de la población de nuestra zona hospitalaria.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

- Se estudia una población de 89 gestantes desde 2016 a 2021 donde se observan las siguientes características.
- En el análisis inferencial, encontramos que en mujeres primíparas hay mayor número de preeclampsias precoces y que se asocia con bajo peso del recién nacido

	PREECLAMPSIAS		
	PRECOZ	TARDÍA	p
	VARIABLES MATERNAS		
Afroamericanas	4,5%	3%	NS
>35 años	45,5%	41,8%	NS
HTA	16,6%	6,1%	NS
ERC	0%	0%	NS
Enf Autoinmune	9,1%	1,5%	NS
DM	9,1%	10,6%	NS
Obesidad	45,5%	62,7%	NS
Primigesta	81,8%	44,8%	p<0,01
PE en embarazo previo	0%	7,5%	NS
	VARIABLES PREECLAMPSIA Y RN		
Gestación multifetal	13,6%	4,5%	NS
Ingreso en UCI	0%	3%	NS
Sexo varón en RN	40,9%	55,2%	NS
Bajo peso del RN	95,5%	19,4%	p<0,01

CONCLUSIONES

- En nuestra serie, la preeclampsia se relaciona con los factores de riesgo descritos en la literatura (antecedente previo, HTA, obesidad, DM...).
- Encontramos mayor riesgo de **preeclampsia precoz** en **primíparas** y de mayor de recién nacidos con **bajo peso**.

MATERIAL Y MÉTODO

- Se ha realizado un estudio observacional descriptivo transversal realizado durante un período de 5 años (2016-2021) en las pacientes atendidas en un hospital regional por preeclampsia.
- Se describen **características clínicas de las pacientes, necesidad de estancia en UCI, estancia total del ingreso y características del recién nacido.**

CARACTERÍSTICAS GENERALES POBLACIÓN	
Número de participantes	89 pacientes
Edad media muestra	32 años
>35 años	42%
Primigestas	53% eventos
Antecedentes personales preeclampsia	5,6%
Antecedentes familiares preeclampsia	2,2%
Afroamericanas	3,4%
Enfermedades concomitantes	HTA 8% ERC 0% Enfermedad Autoinmune 3,2% Diabetes gestacional 10,2% Obesidad 58,4%
VARIABLES EMBARAZO	
Embarazos multifetales	6,7%
Preeclampsias precoces	24,7%
Estancia en UCI	2,2%
Estancia media ingreso	5 días
VARIABLES RECIÉN NACIDO	
Sexo varón RN	51,7%
Peso medio RN	3200 g
RN bajo peso	37,1%